HISTAMINA VS BRADICININA

ANGIOEDEMA

GUÍA DE DISTINCIÓN Y MANEJO EN URGENCIAS

INTRODUCCIÓN

LA DISCRIMINACION ENTRE LOS TIPOS DE ANGIOEDEMA EE ESENCIAL PARA UN TRATAMIENTO EFICAZ.

⚠ 9 VECES MÁS RIESGO DE MORTALIDAD SIN UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO

Las causaa de angioedema se pueden dividir en dos grandes rubros. las causadas por hletamina y las causades por bradicinina.

El angioedema mediado por **HISTAMINA** con principalmente provocados por alergia, mientras que las causadas por **BRADICINÍNA** con cumúnmente por disregulaciones del sistema prekaticrsina bradicinma y del sistema contacto-complemento. que puede ser congénitorhereditario (AEH) o adquirido (AEA).

EPIDEMIOLOGÍA


20%


de todas las personas al menos que vez en la vida presentan angioedema **HISTAMINERGICO**

1:50,000

personas padecen angioedema **BRADICINERGICO**

En cuanto a angioedema por medicamentes:





Diferentes causas
Diferentes manejos

COMITÉ DE ANGIOEDEMA DE CMICA,
Colegio Mexicano de Inmunologia Clinica y Alergia

COMPARATIVA

HISTAMINA		BRADICININA
TIEMPO	MINUTOS → RÁPIDO	HORAS-DÍAS → LENTO/GRADUAL
PRURITO Y RONCHAS	PRESENTE	AUSENTE
HISTORIA FAMILIAR	POCO COMÚN	MUY COMÚN
SITIO ANATÓMICO	Lablos, faringe, laringe	Labios, lengua, faringe, laringe, abdomen, manes, ples

